

Communication à l'ensemble des médecins généralistes francophones dans le cadre de la pandémie Covid-19

Le 4 juin 2021

SOMMAIRE

Introduction.....	1
Vaccination Covid-19 : Outil d'aide à la décision	1
En bref	3

INTRODUCTION

L'été se dessine dans le paysage de la vaccination en Belgique : le passeport vaccinal européen approche, l'utilisation des vaccins s'affine, les mesures s'assouplissent et la vaccination s'ouvre bientôt à tous. Au milieu de tout cela, nos patients auront le choix de se faire vacciner et vous ferez sans doute face à leur hésitation. Pour vous aider à discuter avec eux, écouter leurs craintes et répondre à

leurs questions, nous avons créé un outil d'aide à la décision en consultation.

Ce communiqué sera aussi l'occasion de vous partager plusieurs liens, sur la Covid de longue durée et le baromètre de la motivation, notamment. En attendant les vacances, nous espérons que ces outils et informations vous aideront au mieux.

VACCINATION COVID-19 : OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION

Alors que la vaccination devrait prochainement s'ouvrir plus largement à Bruxelles et en Flandre, l'heure est venue de faire le point sur les vaccins qui seront disponibles pour la population. On le sait, les vaccins d'AstraZeneca et de


Johnson&Johnson sont tous les deux réservés aux personnes de 41 ans et plus. Pour le moment, du moins, puisque le 9 juin prochain, l'AstraZeneca ne devrait plus être administré en Belgique pour les premières doses.

À présent, le défi sera d'appréhender l'hésitation vaccinale et d'accompagner les patients dans leurs craintes, leurs doutes et leurs motivations. Si le choix du vaccin ne s'offre pas vraiment à nous, les discussions autour de la décision de se faire vacciner ou non, entreront certainement dans nos cabinets.

Pour vous aider à susciter la discussion et l'engagement de manière ouverte, nous avons créé un bref outil d'aide à la décision que vous retrouverez [sur notre site](#)

Exemple avec le vaccin Pfizer pour un homme entre 30 et 39 ans.

Sans vaccination



■ Décès
■ Hospitalisation
■ Symptômes persistants
■ COVID-19 non sévère

Avec vaccination



■ Hospitalisation
■ Symptômes persistants
■ COVID-19 non sévère
■ Pas de COVID-19
■ Effets secondaires graves

Grâce à ces outils, nous souhaitons répondre aux questions des patients et élaborer des interventions appropriées pour surmonter l'hésitation vaccinale. Comme l'explique [cet article du BMJ](#) : « L'essentiel est d'instaurer la confiance, en particulier en écoutant les préoccupations des gens, en étant respectueux des différentes croyances religieuses ou culturelles, et en étant conscient de la méfiance compréhensible historiquement ancrée, ainsi que d'autres considérations

éthiques autour des interventions cliniques. »

L'approche de l'hésitation vaccinale est complexe. Le dialogue et la bonne communication au niveau individuel sont primordiaux. C'est pourquoi, même si le choix du vaccin est impossible pour le moment en Belgique, nous espérons que cet outil d'aide à la décision vous permettra d'aborder la question de la vaccination avec vos patients les plus dubitatifs.



EN BREF

Covid de longue durée

La vidéo du webinaire organisé par la SSMG en avril dernier sur le Covid de longue durée est désormais disponible en ligne [via ce lien](#).

Baromètre de la motivation

En parlant d'hésitation vaccinale, les rapports du baromètre de la motivation pourraient peut-être vous intéresser. Ils sont disponibles sur le site motivationbarometer.com.

Plus que jamais... prenez soin de vous !



Pour nous contacter:

www.lecmg.be
info@lecmg.be

Le CMG a reçu le soutien de

